



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BF.393/1

2

BF-393/2v

tavolsága, s legyen ez
 $PD = OP$, ha O a
 kémer széle; legyen a
 tárgyban lévő pont
 A ; Anak távolsága
 szélektől Pr reáiránál
 majik plágájában a
 linea fundamentalissa,
 legyen ez pe ; azon A'
 pontnak, melyben az
 Aról borsított A és
 a horizont vágja, képe
 lesz ott a'hol Pr , és
 PD egymáshoz vágja;
 magának Anak képe pedig
 az. a' pont lesz, a'hol
 az iménti képről emelt
 verticalis vágja az a
 reáiránál
 ()

BF-393/3

BF-393/3^u

BF-393/4

rekrár, mely a stem pont,
sol, ugy mint Pröl w,
nattant az pröl emels
f. az A magasságához egyen,
lö. / verucalisnat regire;
Ezen linea magasság li
neájánál hivait, va,
laminat Ip Puncumot
lineájánál, Del distan
siát lineájánál, te,
hat ezen lei lineát
ragatja f. mely neve,
seffis anal, f. keres,
seffis leg elbb.

3. 9.

Mag adant a stem
pontja, stemávolesag,

BF-393/4


a tárgy valamely pontja
 nál vizsgálva a táblára
 nézve P tehát mint a
 távoltsága, mint a ma-
 gassága, mind ha P
 ből a fundamentális
 lineára L nézve bódít
 tatik, pont ottol a li-
 nea fundamentális
 son való távoltsága.
 Innen ez az együt-
 teshet levele, a má-
 sikk a meg adott li-
 nea OC -i, is lineá-
 fundamentális köze-
 ly távoltsága, a hypo-
 thenusa OP meg

BF-393/5


táblánál, melyből a
 meg mondandó módon
 a Pd proportion li-
 jö $\S. 10$

Mindennek módja,
 mint a mondattalnak
 de a következtető.

Mármely h pont
 legyen a táblán, A képe
 esik Sh rectába, ha
 Sh két On keskeny
 vont párhuzamos és
 vágja a táblát: meru
 h vagy OA rectában
 van, és akkor irátos;
 vagy Δ három pont
 jai, mely által egy



BF-393/5^v




Plánum meg hasonlított
 a vágás abba esik. OS
 // hA , és annak vágás,
 ja vh , is a kép h ig
 OA rectának mint a
 tabulának, mint azon
 Plánumban, tehát a
 vágatjába esik.


3. II

Imma ha egy pont A'
 a horizonba esik, annak
 képe $Spbe$ esik, merre
 OD , és Np // hA , merre
 mind a képe a tabulára
 perpendicularis. De
 h en h is hA miatt,
 melyet h is h anover
 és Sp és OA' vág
 nál

BF-393/6



BF-393/6^v



BF-393/2


na^o, és $\triangleleft$ simile $\triangle$ left,
melyekben,, $OP:PA = Pa':ap$,
az az, mivel $OP = PD$,
és $PA = pa$, left.

$PD:pa = Pa':ap$, és
innen,, $PD+pa:PD$
 $= Pa'+ap:Pa'$,
 $\eta = Pp':Pa'$

§. 14

Itogy a' ott van, a
hol $Pp' = Dd$ sárga,
látszik, mert PDa'
 pda' hár, és így ha
 Pa' és ne neveződik:

$PD:pa = x: Pp-x$,
tehát componendo ip,
pen az iménis valóra
jön




BF-393/7

jon ki az x-nel.

§. 17

Hogy pedig Anál ké-
pe, a'bol a tabulán
a linea altitudinisig e,
mely verticalis meg se,
fűt innen; a képi
O.A.A. Δ lumna vagu-
ja a tabulával, ezen va-
gat, s mivel A.A. is a
tabla minden verticalis
his, tehát $\parallel$ $\parallel$ A.A.
hox, is egy a mennye-
je O.A.nál aa, amije-
ja A.A.nál a képi az
a'bol mely verticalis
ban s ha A a horizo-
non feljűl van, ugy a'
bol

BF-393/8



BF-393/8v

